

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ALTUM, B. (1870): Inventarium der zoologischen Sammlung II. Vögel. Neustadt/Eberswalde.
- ALTUM, B. (1880): Forstzoologie. II. Vögel. Berlin.
- ALTUM, B. (1887): Führer durch die Zoologischen Sammlungen der Königlichen Forstakademie Eberswalde. Eberswalde.
- AMAR, A., C.M. HEWSON, R.M. THEWLIS, K.W. SMITH, R.J. FULLER, J.A. LINDSELL, G. CONWAY, S. BUTLER & M.A. MACDONALD (2006): What's happening to our woodland birds? Long-term changes in the populations of woodland birds. RSPB Research Report no. 19. BTO Research Report no. 169. Sandy.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1883): 6. Jahresbericht (1881) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 31: 13-76.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1887): 10. Jahresbericht (1885) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 35: 337-615.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2004): Erster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 238-241.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2005): Zweiter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 283-287.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2006): Dritter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalts (AK ST). Apus 13: 34-37.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2008): Viertes Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 13: 427-437.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2011): Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 16: 64-80.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2012): Sechster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 17: 86-98.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2014): Siebenter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 19: 75-94.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2015): Achter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 20: 65-75.
- BACH, W. (1962): Ein Rotkehlpieper bei Magdeburg. Falke 9: 212.
- BÄR, E. (1958): Ein Baßtölpel-Fund im Kreise Köthen. Falke 5: 33.
- BAIRLEIN, F., J. DIERSCHKE, V. DIERSCHKE, V. SALEWSKI, O. GEITER, K. HÜPPOB, U. KÖPPEN & W. FIEDLER (2014): Atlas des Vogelzuges. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. Wiebelsheim.
- BALDAMUS, A. (1852): Verzeichnis der Brutvögel der Umgegend von Diebzig. Naumannia 2(3): 55-58.
- BALDAMUS, E. (1855): Protokoll der neunten Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Naumannia 5: 226-246.
- BARFKNECHT, R., B. GIESSING & J.-D. LUDWIGS (2007): Aktionsraum und Habitatnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in einer Agrarlandschaft im Nördlichen Harzvorland. Vogelwarte 45: 268.
- BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Wiebelsheim.
- BAUER, H.-G. & F. WOOG (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland – Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46: 157-194.
- BAUER, K.M. & U.N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BEHRENDT, G. (1999a): Der Vogelbestand von Feldstraßen und Feldwegen 1995 im Kreis Köthen. Apus 10: 190-193.
- BEHRENDT, G. (1999b): Die Brutvögel einer Bergbauhalde im Kreis Köthen in den Jahren 1982 und 1993. Apus 10: 193-196.
- BEICHE, S. (1985): Die Schuß- und Fangliste des Försters Carl Andreas Naumann. Versuch einer faunistischen Interpretation. Monogr. Naumann-Mus. 2: 1-121.
- BEICHE, S. & J. LUGE (2006): Habitatauswahl und Reproduktion einer Neuntöter-Population im Nordteil des Köthener Gebietes. Apus 13: 102-123.
- BENECKE, H.-G. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Milde-Niederung/Altmark im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-72.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2009): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2008. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 78-98.
- VAN DEN BERG, A.B. & M. HAAS (2014): WP reports. Dutch Birding 36: 122-130.
- BERNDT, R. (1939): Zur Nistweise des Hausrotschwanzes. Dt. Vogelwelt 64: 9-12.
- BERNDT, R. (1941): Merlin jagt auf Haustauben. Ornithol. Monatsber. 49: 174-175.
- BERTHOLD, P. (1973): Über den starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderer Singvogelarten im westlichen Europa. J. Ornithol. 114: 348-360.
- BERTHOLD, P., U. QUERNER & R. SCHLENKER (1990): Die Mönchgrasmücke. Neue Brehm-Bücherei 603. Wittenberg-Lutherstadt.
- BIERBACH, U. (1987): Schnee-Eule bei Siptenfelde (Harz). Apus 6: 237.
- BIRTH, M. & B. NICOLAI (1970): Bestandsaufnahme der in einem Teilgebiet des Bürger Holzes im Jahre 1969 brütenden Greifvögel. Apus 2: 19-24.
- BLASIUS, R. (1896): Die Vögel des Herzogthums Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Braunschweig.
- BLEY, D., U. MAMMEN & E. GÜNTHER (2015): Die Bedeutung von Pappeln (*Populus spec.*) im nördlichen Harzvorland für den Rotmilan *Milvus milvus*. Abh. Ber. Mus. Heineanum 10, Sonderh.: 63-84.

- BLOCK, B. & P. BLOCK (1986): Zum Brutvorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Flachland und zu ersten Brutnachweisen im Bezirk Potsdam. Mitt. Bezirksarb.gr. Artenschutz Potsdam 2: 30-35.
- BOCK, H. (2008): Wildvogel-Geflügelpest am Helmestausee. Apus 13: 424-426.
- BOCK, H. & S. HERRMANN (2006): Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue. Apus 13: 45-61.
- BÖHM, W. & O. STROHKORB (1964): Eine natürliche Bastardierung zwischen Hausrotschwanz-Weibchen und Gartenrotschwanz-Männchen. Beitr. Vogelkd. 10: 235-236.
- BÖHME, F. (1968): Einige bemerkenswerte Beobachtungen aus der Elbniederung bei Wittenberg. Beitr. Vogelkd. 14: 92.
- BÖSCHE, H.-J. (2002): Erlebnisse mit Hausrotschwänzen. Ziergeflügel Exoten 47: 253-254.
- BOHN (1897): *Pelecanus crispus* bei Zwebendorf erlegt. Saalezeitung (Halle) v. 06.10.1897.
- BORCHERT, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg.
- BRACKHAHN, F. (2005a): Gebirgsstelzen (*Motacilla cinerea*) im Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 71-75.
- BRACKHAHN, F. (2005b): Zur Siedlungsdichte des Raubwürgers *Lanius excubitor* in der Heide. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 76-77.
- BRACKHAHN, F. (2008): Gebirgsstelzen *Motacilla cinerea* im Raum Magdeburg – Vorkommen und Nistplätze. Apus 13: 420-423.
- BRAUNEIS, J. (2014): Die Wachtel (*Coturnix coturnix*): Heimkehr eines einheimischen Wildvogels oder Scheinblüte einer Invasionsvogelart? – Betrachtungen am Beispiel des nordhessischen Berglandes. Acta ornithoecol. 8: 3-18.
- BRENNECKE, R. (1975): Greifvogelbestandsaufnahmen bei Behnsdorf (Kreis Haldensleben) und ihre Auswertung. Mitt. IG Avifauna DDR 7: 3-17.
- BRENNECKE, R. (1998): Gottlob von Nathusius (1884-1948) als Ornithologe und Vogelsammler. Jschr. Mus. Ohrekr. 5: 55-82.
- BRENNECKE, R. (2005): Nachweise aus Born (Altmark) oder Borne (Börde): Mönchsgeier, Mehlschwalben? Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 78-79.
- BRENNECKE, R. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 25: 2-34.
- BRENNECKE, R. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 26: 2-33.
- BRENNECKE, R. (2009): Der Forstmann Friedrich Menzel (1867-1935) – Ornithologe, Vogelschützer, Eier- und Vogelsammler. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 102-130.
- BRENNECKE, R. (2012): Preußische Forstbeamte aus der Familie Meyerinck mit ornithologischen Kenntnissen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 30: 43-74.
- BRICHETTI, P. & G. FRACASSO (2003): Ornitologia Italiana. Vol. 1. Gaviidae – Falconidae. Bologna.
- BRIESEMEISTER, E. (1997): Die Brutvögel des Magdeburger Rotehornparkes. Apus 9: 245-258.
- BRIESEMEISTER, E. (2002): Mittlere Erstbeobachtungen einiger Vogelarten aus dem Raum Haldensleben und Magdeburg. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 20: 72-73.
- BRIESEMEISTER, E., H. STEIN & K.-J. SEELIG (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 1) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. Magdeburg.
- BRINKMANN, M. (1919): Die abweichende Zusammensetzung der Vogelwelt im östlichen und westlichen Süden der Provinz Hannover. Ein Beitrag zur Avifauna von Hannover. 5. bis 10. Jber. der Niedersächs. Zool. Vereinigung 48-82.
- BRINKMANN, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.
- BRUECKMANN, F. E. (1749): Epistola itineraria XVII. sistens. Aves Sylvae Hercynicae (ad. Dn. Joh. Heinr. Zorn, d. 6. Nov. 1745, in Epp. itiner. Cent. II, 143-162). Wolfenbüttel.
- BÜRGER, M. (1963): Baßtöpel, *Morus bassanus*, im Bezirk Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 313-314.
- BURFIELD, I. & F. VAN BOMMEL (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge.
- BUSCHENDORF, J. (2011): Hassen und Kleptoparasitismus. Apus 16: 102.
- BUSCHING, W. (2003): Die Vogelsammlung Johann Friedrich Naumanns im Naumann-Museum Köthen (Vogelbestände im Saal 3). Bl. Naumann-Mus. 22: 1-44.
- CADE, T., P. KOSKIMIES & O. K. NIELSEN (1998): *Falco rusticolus* Gyrfalcon. BWP Update. The Journal of Birds of the Western Palearctic 2: 1-25.
- CIMIOTTI, D. V., R. SCHULZ, B. KLINNER-HÖTKER & H. HÖTKER (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland: Seeregenpfeifer. Falke 62: 24-29.
- CLAUSING, P. & W. GLEICHNER (1978): Überwinternde Rotmilane, *Milvus milvus*, bei Bernburg, Mühlhausen und im Nordharz-Vorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 3: 23-30.
- CLEVEN, B. & W. TÖPFER (1966): Die Brutdichte im Peißnitz-Auwald (Halle). Apus 1: 48-52.
- DATHE, H. (1940): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Drömlings (Altmark). (Fortsetzung, Schluß). Beitr. Avifauna Mitteldt. 4: 3-21, 49-54.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2012): Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. Seltene Vögel Dt. 2010: 10-49.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. Seltene Vögel Dt. 2011-2012: 2-47.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. Seltene Vögel Dt. 2013: 2-39.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. Seltene Vögel Dt. 2014: 2-36.
- DEUTSCHE ORNITHOLOGEN-GESELLSCHAFT (DO-G) (1868): Bericht über die XVI. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Kiel am 2ten, 3ten und 4ten Juni 1868. Münster.

- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. *Limicola* 8: 153-216.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1995): Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. *Limicola* 9: 77-109.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. *Limicola* 10: 209-257.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. *Limicola* 11: 153-208.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. *Limicola* 12: 161-227.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2000): Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. *Limicola* 14: 273-339.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. *Limicola* 16: 113-184.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2005): Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. *Limicola* 19: 1-63.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. *Limicola* 20: 281-353.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. *Limicola* 22: 249-339.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257-334.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). *Limicola* 24: 233-286.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, F. JACHMANN & F. STÜHMER (2006): Ornithologischer Jahresbericht 2005 für Helgoland. *Ornithol. Jber. Helgoland* 16: 1-60.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPOP, O. HÜPPOP, K. F. JACHMANN (2011): Die Vogelwelt der Insel Helgoland. Helgoland.
- DIESSNER, F. (1966): Schnee-Eule im Kreis Köthen. *Falke* 13: 426.
- DOBBRICK, W. (1933): Die Zaunammer in Weißenfels (Prov. Sachsen). *Ornithol. Monatsber.* 41: 55-56.
- VAN DONGEN, R. M., R. HOFLAND & P. W. W. DE ROUW (2007): Recente meldungen September – Oktober 2007, Nederland. *Dutch Birding* 29: 400-411.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 39: 138-143.
- DORNBUSCH, M. (1977): Rauhfußkauz bei Steckby. *Apus* 4: 43-44.
- DORNBUSCH, M. (1990): Ein interessanter Ringfund. Habichtskauz-Nachweis. *Falke* 37: 300-301.
- DORNBUSCH, M. (2012): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. Stand: 31.12.2010. *Apus* 17, Sonderh. 2: 1-63.
- DORNBUSCH, M. & C. DORNBUSCH (2010): Ein Adlerbussard *Buteo rufinus* bei Steckby. *Apus* 15: 69-70.
- DRIECHCIARZ, R. & E. DRIECHCIARZ (2009): Vergleichende Untersuchung zur Jagdstrategie ausgewählter Greifvogelarten und damit verbundene Nutzungshäufigkeit verschiedener Landschaftselemente. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eularten*, Bd. 6: 181-186.
- DUDÁS, M., G. KOVÁCS & I. SÁNDOR (1993): Der Adlerbussard *Buteo rufinus* als mitteleuropäischer Brutvogel in der ungarischen Hortobágy-Puszta. *Limicola* 7: 141-146.
- EBELING (1871): Schneeeule bei Domersleben. Bl. Handel, Gewerbe und soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.: 110.
- EBELING (1874): Die Magdeburgische Vogelwelt. Bl. Handel, Gewerbe soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.: 182.
- ERTAN, K. T. (2000): Evolutionary Biology of the genus *Phoenicurus* – Phylogeography, natural hybridisation and population dynamics. Marburg.
- EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2012): EEA Technical Report: The impacts of invasive alien species in Europe. No. 16.
- FEUERSTEIN, W. (1953): Neues vom Rauhfußkauz, *Aegolius f. funereus* (L.). *Mitt. Thür. Ornithol.* 4: 28-29.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2007): Meldungen aus den Beringungszentralen. *Vogelwarte* 45: 227-229.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2008): Meldungen aus den Beringungszentralen. *Vogelwarte* 46: 59-60.
- FISCHER, S. (2009): Sechs Jahre Beringungsarbeit an einem IMS-Fangplatz in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-66.
- FISCHER, S. (2012): Zehn Jahre Punkt-Stopp-Zählungen im EU SPA Zerbster Land. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 85-94.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2004): Bestandssituation seltener Vogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2001 bis 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 5-31.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2005): Bestandssituation seltener Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 3-23.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2006): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-27.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2007): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-30.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2009): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010b): Abschluss der Ersterfassungen wertgebender Brutvogelarten in den Europäischen Schutzgebieten Sachsen-Anhalts. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2011): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2012): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-35.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2012. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-38.

- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014b): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 5-39.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2014. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 5-41.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015b): Bestand und Bestandsentwicklung der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 71-80.
- FISCHER, S. & A. PSCHORN (2012): Brutvögel im Norden Sachsen-Anhalts – Kartierung auf TK25-Quadranten von 1998 bis 2008. Apus 17, Sonderh. 1: 9-236.
- FLOERICKE, C. (1927): Zum Vorkommen des Uhu. Mitt. Vogelwelt 26: 40.
- FORRESTER, R. & I. ANDREWS (2007): The Birds of Scotland. Vol. 2. Aberlady.
- FRANSSON, T. & S. HALL-KARLSSON (2008): Svensk ringmärkningsatlas Vol. 3. Stockholm.
- FRANZ, E. (1963): Die Sperbergrasmücke im Raum Magdeburg. Falke 10: 114-115.
- FREIDANK, K. & L. PLATH (1982): Zur Vogelwelt der Elbe-Havel-Winkels. Genthin.
- FRIEDRICHS, T. (2016): Zur Überwinterung der Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* in der Altmark. Apus 21: 60-65.
- FRITSCH, G. (1992): Kolkraben- und Rotmilanbrut auf Hochspannungsmasten im Kreis Weißenfels. Apus 8: 91-92.
- FRITSCH, G. (1995): Wiederansiedlung der Gebirgsstelze im Kreis Weißenfels. Apus 9: 135.
- FRÜHAUF, W. & M. DORNBUSCH (1978): Höchstalder des Kernbeißers. Falke 25: 212-213.
- FUCHS, E. (1963): Der Rauhfußkauz, *Aegolius funereus*, Brutvogel im Harz. Beitr. Vogelkd. 8: 469-470.
- GÄTKE, H. (1891). Die Vogelwarte Helgoland. Braunschweig.
- GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S. FRICK, I. GEIERSBERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜBING, S.R. SUDMANN, R. STEFFENS, F. VÖKLER & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Münster.
- GEHLHAAR, H. & R. WEIßGERBER (2009): Brutgrößen von Greifvögeln und Eulen im Zeitzer Land. Apus 14: 35-43.
- GENTZ, K. (1955): Zur Verbreitung des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers. Falke 2: 113-114.
- GEORGE, B. (2009): Die Gebäudebrüter in Dessau-Zoerberg und Dessau-Schaftrift (Stadt Dessau-Roßlau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 21: 5-17.
- GEORGE, K. (1983): Zum Vorkommen der Wachtel *Coturnix coturnix* (Linné, 1758) in der Deutschen Demokratischen Republik. Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sektion Pflanzenproduktion.
- GEORGE, K. (1989): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland. Acta Ornithoecol. 2: 65-77.
- GEORGE, K. (1994): Zur Überwinterung von Rotmilanen *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). Vogelwelt 115: 127-132.
- GEORGE, K. (1995a): Überwinterung von Rotmilanen (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland/Sachsen-Anhalt. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 59-66.
- GEORGE, K. (1995b): Herkunft und Alter überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* nördlich der traditionellen Winterquartiere. Vogelwelt 116: 311-315.
- GEORGE, K. (1996): Entwicklung der Anzahl überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* L. zwischen Harz und Havel bis 1994. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 199-205.
- GEORGE, K. (1999): Sommerlebensräume der Wachtel *Coturnix coturnix* in der mitteleuropäischen Agrarlandschaft. NNA-Berichte 12 (3): 88-92.
- GEORGE, K. (2001): Langjährige Bestandsaufnahmen der Wachtel: Gute Aussichten in Ostdeutschland. Falke 48: 309-311.
- GEORGE, K. (2004): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt insbesondere nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Apus 12: 1-138.
- GEORGE, K. (2010): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt. Naturschutzarb. Sachsen 52: 66-73.
- GEORGE, K. & B. NICOLAI (1996): Lebenserwartung freilebender Milane (*Milvus milvus*, *Milvus migrans*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 49-51.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 259-290.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 37-71.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 125-160.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2000): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1999 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 221-259.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2001): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 1-36.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2002): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2001 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 127-177.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2003): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2002 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 283-326.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2004): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2003 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 205-237.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2005): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2004 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 257-287.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2006): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 3-33.
- GIERTH, D. (1967): Rallenreih bei Halle. Falke 14: 138.
- GLATZEL, K. & J. ZAUMSEIL (1997): Der Rosenstar (*Sturnus roseus* L.). Erstnachweis für das Gebiet des Burgenlandkreises. Saale-Unstrut-Jahrb. 2: 79-80.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2013): Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten. Apus 18:161-163.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2015): 50 Jahre Greifvogelkartierung im Plötzkauer Auwald 1964-2013. Apus 20: 16-37.

- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER & A. BOBBE (2008): Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum. Apus 13: 355-356.
- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER, A. BOBBE, U. HENKEL & S. KAMP-RATH (2013): Die Schlafplätze des Rotmilans *Milvus milvus* im Altkreis Bernburg von 1985 bis 2013. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 37-49.
- GLEICHNER, W. & K. ZAPPE (1980): Die Graureiherkolonie bei Plötzkau (Kr. Bernburg). Apus 4: 167-171.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 8. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1989): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. 3. Aufl., Wiesbaden.
- GNIELKA, R. (1965): Die Vögel der Rabeninsel bei Halle (Saale). Ergebnisse ganzjähriger quantitativer Bestandsaufnahmen in einem Stieleichen-Eschen-Ulmen-Auwald. Hercynia N.F. 2: 221-254.
- GNIELKA, R. (1974): Die Vögel des Kreises Eisleben. Apus 3: 145-248.
- GNIELKA, R. (1977a): Avifaunistischer Jahresbericht 1974 für den Bezirk Halle. Apus 4: 25-39.
- GNIELKA, R. (1977b): Zwergohreule in Halle. Apus 4: 43.
- GNIELKA, R. (1978): Der Einfluß des Ulmensterbens auf den Brutvogelbestand eines Auwaldes. Apus 4: 49-66.
- GNIELKA, R. (1979): Avifaunistischer Jahresbericht 1975 für den Bezirk Halle. Apus 4: 97-112.
- GNIELKA, R. (1981): Die Vögel des Südfriedhofes Halle. Ergebnisse ganzjähriger Bestandsaufnahmen 1964-1978. Hercynia N.F. 18: 134-184.
- GNIELKA, R. (1982): Avifaunistische Daten aus dem Fotonotizbuch von Fritz Stenzel. Apus 5: 38-40.
- GNIELKA, R. (1983a): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 1: Halle.
- GNIELKA, R. (1983b): Vogelwelt des Kreises Querfurt. Erläuteretes Verzeichnis der im Kreis Querfurt nachgewiesenen Vogelarten. Querfurt.
- GNIELKA, R. (1983c): Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Bezirk Halle. Apus 5: 101-112.
- GNIELKA, R. (1983d): Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle. Apus 5: 112-122.
- GNIELKA, R. (1984): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 2. Halle.
- GNIELKA, R. (1987a): Die Brutvögel der Autobahngehölze in der Ackerlandschaft bei Halle. Apus 6: 244-248.
- GNIELKA, R. (1987b): Daten zur Brutbiologie der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) aus dem Bezirk Halle. Beitr. Vogelkd. 33: 103-113.
- GNIELKA, R. (1989a): Avifaunistischer Jahresbericht 1983 für den Bezirk Halle. Apus 7: 97-112.
- GNIELKA, R. (1989b): Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Bezirk Halle. Apus 7: 112-124.
- GNIELKA, R. (1993): Die Brutvögel eines Villengebietes 1966-1992. Apus 8: 172-181.
- GNIELKA, R. (1995): Die frühere Verbreitung des Rotkopfwürgers in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 9-19.
- GNIELKA, R. (2001): Wie verfälscht der „persönliche Faktor“ die Ergebnisse von Vogelerfassungen? Ornithol. Mitt. 53: 156-161.
- GNIELKA, R. (2005): Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel. Apus 12, Sonderh.: 1-167.
- GNIELKA, R. (2010): Brutvogelatlas des Altkreises Haldensleben. Apus 15, Sonderh.: 1-185.
- GNIELKA, R. (2014): Die Vögel des Südfriedhofes Halle 1964-2005. Apus 19, Sonderh.: 1-252.
- GNIELKA, R. & T. SPRETKE (1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Bezirk Halle. Apus 4: 241-253.
- GNIELKA, R. & J. ZAUMSEIL (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Südtails 1990 bis 1995. Halle.
- GOEZE, J.A.E. & J.A. DONNDORF (1795): Europäische Fauna oder Naturgeschichte der europäischen Thiere. Bd. 5. Leipzig.
- GRAF ZU WALDECK UND PYRMONT, H. (1934): Brut des Merlins im Regierungsbezirk Merseburg. Ornithol. Monatsschr. 59: 191-192.
- GRAFF, H. (1970): Bemerkenswerte Vogelarten im Mennewitzer Teichgebiet. Falke 17: 20-23.
- GREMPE, G. (1968): Rotkopfwürger bei Wittenberg. Apus 1: 254.
- GRIMM, H. & J. HAENSEL (1991): Zur Sommernahrung des Raubwürgers, *Lanius excubitor* L., im Süd- und Nordharzvorland. Beitr. Vogelkd. 37: 129-147.
- GROTE, H. (1905): Beiträge zur heimischen Avifauna (Aus der Vogelsammlung der Kgl. Forst-Akademie Eberswalde). Ornithol. Monatsber. 13: 1-7.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2012): Die Vögel auf dem Ausberg im Naturschutzgebiet "Selketal" im Harz 1991, 2005, 2012. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 81-90.
- GÜNTHER, E. & B. OHLENDORF (1990): Steinrötel *Monticola saxatilis* und Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 22: 68-69.
- GÜNTHER, E. & M. WADEWITZ (1990): Der Bestand der Greifvögel im Huy (Nördliches Harzvorland) im Jahre 1981. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1: 1-3.
- GUYOMARC'H, J.C. (2003): Elements for a Common Quail (*Coturnix c. coturnix*) management plan. Game and Wildlife Science 20: 1-92.
- HADARICS, T. & T. ZALAI (2008): Nomenclator Avium Hungariae. MME Budapest.
- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, E. SCHWARZE (1983): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 1. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 3-96.

- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, L. REICHHOFF & E. SCHWARZE (1985): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 2. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 97-200.
- HAENSEL, J. (1963): Vom Schwarzstirnwürger (*Lanius minor* Gmelin) im nordöstlichen Harzvorland, seine Bestandsschwankungen und ihre vermutlichen Ursachen. Beitr. Vogelkd. 8: 353-360.
- HAENSEL, J. (1964): Zur Ernährungsbiologie des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor* Gm.) nach Gewölluntersuchungen im nördlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkd. 10: 199-210.
- HAENSEL, J. (1968): Rotkehlpieper (*Anthus cervinus* (Pall.)) an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109-110.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1974): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 2: 1-96.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1978): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 3: 97-198.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1981): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 4: 199-261.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1984): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 5: 263-358.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1987): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 6: 359-462.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1990): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 7: 463-538.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1991): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 1: 539-630.
- HAGEMEIJER, W. J. M. & M. J. BLAIR (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds – their Distribution and Abundance. London.
- HAMPE, A., T. HEINICKE & A. HELBIG (1996): Erste Brut der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Deutschland. Limicola 10: 311-316.
- HAMPE, H. (1966): Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) bei Dessau. Beitr. Vogelk. 12: 118.
- HAMPE, H. (1970): Das Vorkommen der Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Dessauer Raum. Apus 2: 75-82.
- HAMPE, H. (1975a): Der Raubwürger im Dessauer Raum. Apus 3: 267-271.
- HAMPE, H. (1975b): Winterbeobachtung der Mönchsgrasmücke. Apus 3: 289-290.
- HAMPE, H. (1977): Novemberbeobachtung eines Rotrückenswürgers. Apus 4: 45.
- HAMPE, H. (1986): Albinismus bei einem Hausrotschwanz. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 34.
- HAMPE, H. (1988): Überwinterung einer Mönchsgrasmücke. Apus 7: 40-41.
- HEIDECHE, D. (1972): Die Siedlungsdichte der Brutvögel einer Pappelpflanzung im Gerlebogker Teichgebiet. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 25-40.
- HEINE, F. (1877): *Monticola saxatilis* im Harze ausgebrütet. (Correspondenzblatt VII. VIII. des Naturwissenschaftlichen Vereines für die Provinz Sachsen und Thüringen in Halle). Z. ges. Naturwiss. 3. Folge, 1(=49): 100-103.
- HEINEMANN, H. (1902): Die Pieper oder Spitzlerchen (*Anthus*). Gefied. Welt 31: 209-210, 217-218, 226.
- HEINROTH, O. (1921): Bericht über die Septembersitzung 1921. J. Ornithol. 69: 573-575.
- HELLMANN, M. (1990): Der herbstliche Greifvogelzug am nördlichen Harzvorland. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1(2): 1-11.
- HELLMANN, M. (1996): Untersuchungen an Schlafplätzen von Rotmilan und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 111-132.
- HELLMANN, M. (1999): Die Entwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* vom Nahrungsgast zum Brutvogel in der Stadt Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 93-107.
- HELLMANN, M. (2002): Der Winterbestand des Rotmilans *Milvus milvus* 2000/01 und 2001/02 im Land Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 57-80.
- HELLMANN, M. (2008): Schneesperling *Montifringilla nivalis* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 26: 1-10.
- HELLMANN, M. (2011): Der Bestand des Rotmilans *Milvus milvus* im Spätherbst und Winter in einem Schlafgebiet im nördlichen Harzvorland von 1995 bis 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 27-47.
- HELLMANN, M. (2015): Die Vogelwelt auf dem Brocken im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 33: 1-96.
- HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI (1998): Die Vögel des Brockenurwaldes: Vorkommen, Siedlungsdichte, Avizönose. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 16: 103-136.
- HELLMANN, M. & M. WADEWITZ (2000): Die Vögel der Brockenkuppe. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 1-49.
- HELLWIG, T. (2004): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 33-39.
- HELLWIG, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 78-82.
- HELLWIG, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Fiener Bruch im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 83-85.
- HEMPEL, C. & W. REETZ (1957): Der Zug von Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) und Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 19: 97-119.
- HENNING, O., J. BRAUN & T. FRIEDRICH (2017): Erst- und Zweitnachweis des Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* in Sachsen-Anhalt 2014. Apus 22: 96-101.
- HERDAM, H. (1967): Siedlungsdichte der Vögel auf Kontrollflächen am Westrand der Magdeburger Börde. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 2: 49-66.
- HERRMANN, C. & M. JUNGE (2013): Die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012. Seevögel 34: 86-148.
- HEUER, J. (1998): Merlin erbeutet Bekassine. Apus 10: 93-94.
- HILDEBRANDT, H. (1927): Adolf Gueinzus als Vogelkundiger. J. Ornithol. 75: 425-433.

- HILDEBRANDT, G. (2007): Johann Andreas Naumanns "Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder" (1795-1817). *Apus* 13: 3-164.
- HINSCHKE, A. (1933): Total-Albinismus bei *Lanius c. collurio* L. *Ornithol. Monatsber.* 41: 186-187.
- HINSCHKE, A. (1935): Zweimalige Beobachtung des Wasserpiepers (*Anthus s. spinoletta* [L.]) bei Wörlitz. *Beitr. Avifauna Anhalts* 4: 22-23.
- HINSCHKE, A. (1937): Wasserpieper, *Anthus s. spinoletta* (L.), bei Vockerode. *Beitr. Avifauna Mitteldt.* 1: 13-14.
- HINSCHKE, A. (1966): Rotkehlpieper bei Bösewig. *Apus* 1: 96-97.
- HINSCHKE, A. (1968): Herbstbeobachtung des Rotkehlpiepers bei Wittenberg. *Apus* 1: 201.
- HINSCHKE, A. (1971): Der Greifvogelbestand der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau (Landschaftsschutzgebiet Mittlere Elbe). *Apus* 2: 171-177.
- HIRSCHFELD, K. (1969): Zum Vorkommen des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers im Kyffhäuser-Unstrut-Gebiet. *Apus* 1: 270-276.
- HÖHNE, R. (1993): Bruten der Gebirgsstelze bei Halle. *Apus* 8: 189-190.
- HÖHNE, R. (1996): Ein Merlin im August. *Apus* 9: 185-186.
- HOEBEL, W. (1982): Steppenkiebitz im Saalkreis. *Apus* 4: 281-282.
- HOEBEL, W. (1987b): Die Brutvögel ausgewählter Landschaftselemente im nordwestlichen Saalkreis. *Apus* 6: 249-255.
- HOERNECKE, E. (2002): Großinsekten als Nahrung des Rotmilans. *Apus* 11: 209-210.
- HOFMANN, E. & G. RIEGER (1979): Ein Rauhfußkauz im Kreis Merseburg. *Apus* 4: 142-143.
- HOLZÄPFEL, R. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Landgraben-Dumme-Niederung in den Jahren 2003/2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 61-66.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1992): *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 1. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1994): *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 2. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1996): *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 3. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1997): *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 4. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2006): *Handbook of the Birds of the World.* Vol. 11. Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR (2014): *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World.* Vol. 1. Barcelona.
- HOLTZBERG (1925): Eine Zwergohreule in Braunschweig. *Ornithol. Monatsber.* 33: 93.
- HORVÁTH, M., L. HARASZTHY, J. BAGYURA & A. KOVÁCS (2000/2001): Eastern Imperial Eagle (*Aquila heliaca*) populations in Europe. *Aquila* 107/108: 193-204.
- HUBATSCH, K. (2008): Zweiter deutscher Nachweis eines Habichtsadlers *Aquila fasciata* in Nordrhein-Westfalen. *Limicola* 22: 177-180.
- HÜBNER, M. (1920): Fremde Gäste. *Ornithol. Monatsschr.* 45: 140-141.
- HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H. HAUPT, T. RYSLAVY, P. SÜDBECK & J. WAHL (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. *Ber. Vogelschutz* 49/50: 23-83.
- IfAÖ (2011): Spezielle Untersuchungen zur Ursachenermittlung von Bestandsveränderungen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt: Analyse von populationsökologischen Parametern, Wanderbewegungen und Todesursachen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt anhand von Beringungs- und Wiederfunddaten der Beringungszentrale Hiddensee. *Unveröff. Ber. i. Auftr. des LAU.*
- JENTZSCH, M. (1989): Zum Brutvorkommen von Wacholderdrossel und Raubwürger im Kreis Sangerhausen. *Apus* 7: 131-135.
- JENTZSCH, M. & F. OTTO (1988): Untersuchungen an Wintergewöllen des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.). *Beitr. Vogelkd.* 34: 93-100.
- JURGEIT, S. (1996): Nordische Schafstelzen an der Kiesgrube Sollnitz. *Apus* 9: 191-192.
- JUST, A. (1832): Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salzsee vorkommenden Vögel. Leipzig.
- KACZMAREK, U. (2009): Die Gebäudebrüter in Roßlau, Streetz und Natho. *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 21: 19-31.
- KALLENBACH, G., U. PATZAK & F. JURGEIT (2006): Gebäudebrüterschutz in Sachsen-Anhalt am Beispiel der Stadt Dessau. *Natursch. Land Sachs.-Anhalt* 43: 21-29.
- KAMP, J. (2008): Der Steppenkiebitz – Forschung an einer weltweit bedrohten Art. *Falke* 55: 130-135.
- KAMP, J. (2010): Neues vom Steppenkiebitz. *Falke* 57: 113-115.
- KAMP, J. (2011): Zug des Steppenkiebitzes – live im Internet. *Falke* 58: 101-103.
- KARLSTEDT, K. (1979): Die Bedeutung des Helmestausees für Wasservögel. *Beitr. Vogelkd.* 25: 75-80.
- KATTHÖVER, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Altengraber Heide in den Jahren 2003/04. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 87-93.
- KATTHÖVER, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Nordöstlicher Unterharz im Jahr 2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 100-105.
- KEIL, D. (1984): Die Vögel des Kreises Hettstedt. *Apus* 5: 149-208.
- KEIL, D. (1996): Steppenkiebitz, *Chettusia gregaria* (PALLAS 1771), an den Fischteichen Auleben und am Helmestausee. *Thür. Ornithol. Mitt.* 46: 55-57.
- KIPP, F.A. (1956): Die Gattung *Coturnix* – eine Invasionsvogelgruppe. *Vogelwarte* 18: 160-164.
- KISS, J.B. & L. SZABÓ (2000): Der Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus* als europäischer Brutvogel im Donaudelta. *Limicola* 14: 113-123.
- KLAMMER, G. (1991): Untersuchungen im östlichen Saalkreis zum Bestand und zur Reproduktion von Greifvögeln und Eulen, die auf Elektrogittermasten horsten. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2:* 79-83.
- KLEBB, W. (1984): Die Vögel des Saale-Unstrut-Gebietes um Weißenfels und Naumburg. *Apus* 5: 209-304.

- KLEINSCHMIDT, O. (1907/08): *Erithacus Domesticus*. Berajah: 1-14.
- KLEINSCHMIDT, O. (1912): Stichproben über den Vogelbestand des Kulturlandes. *Falco* 8: 2-15, 17-23, 25-40, 59-81.
- KNOLLE, F., P. MANNES & H. ZANG (1973): Bestandsabnahme des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Westharz. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 5: 1-7.
- KNOPE, O. (1940): Zwei Bruten von Schwarzkehlchen bei Aken an der Elbe. *Beitr. Avifauna Mitteldt.* 4: 54-58.
- VON KNORRE, D., G. GRÜN, R. GÜNTHER & K. SCHMIDT (1986): *Die Vogelwelt Thüringens*. Jena.
- KOCH, E. & B. ROHN (1987): *Die Brutvögel Halle-Neustadts*. Halle.
- KÖNIG, C., S. STÜBING & J. WAHL (2014): Vögel in Deutschland aktuell: Frühjahr 2014: Frühe Bruten, eilige Klappergrasmücken und viele Weißflügel-Seeschwalben. *Falke* 61: 24-29.
- KÖNIG, H. (1968): Die Vogelbestände einiger Bestandstypen des Kiefernforstes und der *Calluna*- und Grasheide in den Thekenbergen (Kreis Halberstadt) in den Jahren 1961-1963. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* 3: 67-98.
- KÖNIG, H. (1971): Rotrückenvürger (*Lanius collurio*) füttert adulten Rotkopfvürger (*Lanius senator*). *Beitr. Vogelkd.* 17: 184.
- KÖNIGSTEDT, D. & B. NICOLAI (1972): Zur Kenntnis der Avifauna des Kreises Burg – I. Teil. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* 7: 43-80.
- KOLBE, E. (1932): *Surnia ulula ulula* (L.) bei Klieken. *Beitr. Avifauna Anhalts* 3(2): 1.
- KOLBE, E. (1937): Die Gebirgsstelze, *Motacilla c. cinerea* Tunst., als Brutvogel bei D.-Roßlau. *Beitr. Avifauna Mitteldt.* 1: 18-20.
- KOLBE, H. (1963): Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) auf der südlichen Flämingabflachung. *Vogelwelt* 84: 84-90.
- KOLBE, H. (1966): Phänologische und brutbiologische Daten der Gebirgsstelzen-Population der südlichen Flämingabdachung. *Apus* 1: 80-82.
- KOLBE, H. (1999): *Die Entenvögel der Welt*. 5. Aufl. Stuttgart.
- KOLBE, H. (2009): Rauhfußkauz *Aegolius funereus* und Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* als neue Brutvogelarten im Hohen Fläming. *Apus* 14: 3-13.
- KOLBE, M. (1965): Ringelgans und Rotkehlpieper auf dem Frühjahrsdurchzug im Mittelbegebiet. *Falke* 12: 211.
- KOOP, B. & R. K. BERNDT (2014): *Zweiter Brutvogelatlas. Vogelwelt Schleswig-Holsteins*. Bd. 7. Kiel.
- KOOP, D. (1971): Ergebnisse mehrjähriger Greifvogel-Kartierung in einem Auwald der unteren Saale. *Apus* 2: 177-183.
- KRAUSE, S. (1987): Die Brutvögel eines Haldengehölzes bei Halle. *Apus* 6: 256.
- KRATZSCH, L. & U. PATZAK (2010): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Drömling im Jahr 2009. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 39-53.
- KRATZSCH, L. & M. STUBBE (2003): Untersuchungen zum Höhlenbrüterbestand des Hakels im nördlichen Harzvorland. *Tiere im Konflikt* 8: 3-160.
- KRIEGS, J. O., F. BINDRICH & H. H. DÖRRIE (2012): Das Auftreten der Rötelschwalbe *Cecropis daurica* in Deutschland. *Seltene Vögel Dt.* 2010: 58-63.
- KRIETSCH, C. (1926): Hochbrut eines Grauummers. *Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel* 2: 35-37.
- KRIETSCH, C. (1932): *Clamater glandarius*, Häherkuckuck bei Dessau! *Mitt. Vogelwelt* 31: 114.
- KRÜGER, A. (1925): Verzeichnis der Vogelsammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde. *Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkd. Magdeburg* 4: 203-229.
- KRÜGER, T. (2013): Das Vorkommen der Sperbereule *Surnia ulula* in Deutschland. *Vogelwelt* 134: 203-232.
- KRÜGER, T. & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. *Limicola* 21: 185-217.
- KRÜGER, T., J. LUDWIG, S. PFÜTZKE & H. ZANG (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. *Natursch. Landschaftspf. Niedersachs.* 48: 1-552.
- KÜHLHORN, F. (1935): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. *Mein Mansfelder Land, Beil. Eisleber Ztg.* 10: 190-200, 233-236, 364-368.
- KÜHLHORN, F. (1938): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. 2. Nachtrag. *Mein Mansfelder Land, Beil. Eisleber Ztg.* 13: 105-124.
- KUHLIG, A. & K. HEINL (1983): Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld. Teil 1 u. Teil 2. *Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.*: 1-48, 49-96.
- KUHLIG, A. & H. MAHLER (1993): Raubwürger brütet auf Gittermast. *Apus* 8: 238-239.
- KUHLIG, A. & M. RICHTER (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. *Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.*: 1-204.
- KUHNERT, M. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Kletzer Heide im Jahr 2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 73-77.
- KUMMER, J. (1962): Ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. *Beitr. Vogelkd.* 7: 450-451.
- KUMMER, J. (1977): Wieder ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. *Beitr. Vogelkd.* 23: 190-191.
- KUMMER, J. (1983): Beitrag zur Avifauna von Halle. *Apus* 5: 53-66.
- KUMMER, J., M. MÜLLER & H. STEIN (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* 8: 31-77.
- KUPPE, K. (1968): Zu Vorkommen des Rotkopfvürgers – *Lanius senator* L. – im Gebiet des Süßen Sees bei Eisleben. *Apus* 1: 171-172.
- KURTHS, J. (1986): Die Vogelbestände des Westfriedhofes in Magdeburg. *Apus* 6: 172-176.
- LANDMANN, A. (1996): Der Hausrotschwanz. Vom Fels zum Wolkenkratzer – Evolutionsbiologie eines Gebirgsvogels. Wiesbaden.
- LEHMANN, B., C. ENGELMANN, R. ZSCHÄPE, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2009): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Salziger See und Salztal im Jahr 2007. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 2: 45-52.
- LINDNER, C. (1898): Kleinere ornithologische Mitteilungen. *Ornithol. Monatsschr.* 23: 226-227.
- LINDNER, C. (1907): Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den deutschen Steinsperling (*Petronia petronia*). *Ornithol. Monatsschr.* 32: 398-410.



- LINDNER, C. (1919): Die Brutvögel von Naumburg, Weißenfels, Zeit und Umgegend. Meist nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt und allen Freunden der Natur als ein Beitrag zur Heimatkunde und zur Förderung der Heimatliebe und des Heimatschutzes gewidmet. 2. Aufl. Naumburg a. S.
- LINDNER, C. (1920): Einige Seltenheiten aus der Nähe von Naumburg a. S. in den letzten zwanzig Jahren. Ornithol. Monatsschr. 45: 188-189.
- LINDNER, F. (1886): Einzelnotizen aus meinem ornithologischen Taschenbuch I-III. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 11: 16-20, 39-41, 153-158.
- LINDNER, F. (1901): Grundstein zur Ornis des Fallsteingebietes. Ornithol. Monatsschr. 26: 33-56, 81-96, 117-132, 153-167.
- LINDNER, F. (1904): Zweiter Nachtrag zur Ornis des Fallsteingebietes, umfassend die Zeit vom 1. Juni 1901 bis zum 18. August 1904. Ornithol. Monatsschr. 29: 376-395, 422-439.
- LINDNER, F. (1912): Systematisches Verzeichnis aller bis Juli 1910 nachgewiesenen Vogelarten des Fallsteingebietes mit kurzer Charakteristik ihres Vorkommens. Osterwieck.
- LINDNER, M. & H. KOLBE (2013): 528 Euro für das Fällen eines Höhlenbaumes mit Rauhfußkauzbrut. Eulen-Rundblick 63: 72.
- LIPPERT, W. (1964): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) bei Tangermünde. Beitr. Vogelkd. 9: 377.
- LIPPERT, W. (1974): Rallenreiher, *Ardeola ralloides*, südlich Tangermünde/Elbe beobachtet. Beitr. Vogelkd. 20: 247.
- LIPPERT, W. (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Mahlpfuhler Fenn im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 83-88.
- LIPPERT, W. & R. AUDORF (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Aland-Elbe-Niederung im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 54-60.
- LUDWIGS, J.-D. (2009): Raumnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in der Agrarlandschaft. Vortrag zur 19. Jahrestagung des Vereins Thüringer Ornithologen in Mühlberg.
- LUGE, J. (2002): Neuntöter und Sperbergrasmücke als unmittelbare Brutnachbarn. Apus 11: 278-279.
- LUGE, J. (2004): Beobachtungen an einem Neuntöttervorkommen im Kreis Köthen. Apus 12: 176-189.
- LUTHER, D. (1972): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg. (Harz) I. Apus 2: 218-226.
- LUTHER, D. (1978): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg/Harz (II). Apus 4: 67-70.
- LUTHER, D. & D. LUTHER (1986): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg (III). Apus 6: 110-118.
- MÄDLÖW, W. & C. MAYR (1996): Die Bestandsentwicklung ausgewählter gefährdeter Vogelarten in Deutschland 1990-1994. Vogelwelt 117: 249-260.
- MAKATSCH, W. (1955): Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. Radebeul.
- MAMMEN, K., U. MAMMEN, G. DORNBUSCH & S. FISCHER (2013): Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 10: 1-271.
- MAMMEN, U. (1995): Die Situation der Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes) in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1994. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 13: 101-114.
- MAMMEN, U., B. NICOLAI, J. BÖHNER, K. MAMMEN, J. WEHRMANN, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2014): Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 1-160.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007a): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Fallsteingebiet nördlich Osterwieck im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 89-93.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007b): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Huy nördlich von Halberstadt im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 95-100.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1995): Alterseinschätzung und Brutbeginn des Rotmilans (*Milvus milvus*). Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 91-98.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1996): Der Greifvogelhorst in seiner populationsökologischen Bedeutung. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 87-111.
- MARSHALL, W. (1899): Die Tierwelt des Harzes. In: HOFFMANN, H.: Der Harz, S. 39-60, Leipzig.
- MAUMARY, L., L. VALLOTON & P. KNAUS (2008): Die Vögel der Schweiz. Montmollin.
- MEBS, T. (2001): Aktuelle Verbreitung und Arealerweiterung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. Kauzbrief 14: 4-12.
- MEBS, T. (2008): Zur aktuellen Situation des Habichtskauzes *Strix uralensis* in Europa. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 40: 241-246.
- MEBS, T. & G. NICKLAUS (2014): Die Brutvorkommen der Zwergohreule *Otus scops* in Deutschland. Ornithol. Anz. 53: 94-104.
- MEIER, H. (1969): Neuntöter erbeutet Braunkehlchen. Falke 16: 390.
- MENZEL, F. (1909): Die Vogelwelt von Helmstedt (Herzogtum Braunschweig) und Umgebung. Ornithol. Jb. 20: 85-117.
- MENZEL, F. (1917): Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirkes Harzburg. Ornithol. Jb. 28: 61-80.
- MENZEL, F. (1927): Die Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirkes Calvörde. Ornithol. Monatsschr. 52: 138-147, 153-164.
- MENZEL, F. (1933): Bemerkungen zur Vogelwelt des Freistaates Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Ornithol. Monatsschr. 58: 153-178, 186-189.
- MERTENS, A. (1909): Ein Rosenstar *Pastor roseus* L. in der Altmark. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatk. Magdeburg 2: 100.
- MEYER, A. B. (1889): Die Wanderungen des Rosenstaars (*Pastor roseus* L.) nach Europa, speciell die Wanderung im Jahre 1889. In: MEYER & HELM: IV. Jber. (1888). Orn. Beobachtungsstationen Sachsen, Dresden, Anhang 1: 136-147.
- MIKKOLA, H. (2013): Owls of the World: A Photographic Guide. 2. Aufl. London.
- MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES BRANDENBURG (MLUV) (2009): Die Hainbuche im nordostdeutschen Tiefland – Wuchsverhalten und Bewirtschaftungshinweise. Eberswalder Forstl.Schr.R. Bd. 41: 1-129.

- MISSBACH, D. (1975b): Fische als Beute des Raubwürgers. Falke 22: 314-315.
- MÖCKEL, R. (1996): Arealveränderungen des Raufußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. Vogelwelt: 117: 57-66.
- MRLIK, V. & B. LANDSFELD (2002): The occurrence of Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*) in parts of Central Europe during 1980-1998 and possible factors for its recent expansion. Egretta 45: 104-114.
- MÜLLER, A. (1880): Meine während der Brutzeit gemachten ornithologischen Beobachtungen am Salzigem See bei Eisleben. Zool. Garten 21: 20-24, 48-53, 82-86.
- MÜLLER, A. (1928): Brutvögel des Oberharzes und ihre vertikale Verbreitung. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 18: 160-164.
- MÜLLER, H.-H. (1977): Subfossile Pelikanfunde aus dem Gebiet der DDR. Hercynia N. F. 14: 352-354.
- MÜLLER, H. J. (1953): Schwarzstirn- und Rotkopfwürger im nordöstlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkd. 3: 138-145.
- MÜLLER, J. (1966a): Beobachtungen an Schwarzstirnwürgern (*Lanius minor* Gm.) und Rotkopfwürgern (*Lanius s. senator* L.) aus dem Bördegebiet. Beitr. Vogelkd. 11: 331-333.
- MÜLLER, J. (1966b): Aus der Vogelsammlung des Kreisheimatmuseums Staßfurt. Beitr. Vogelkd. 12: 125-126.
- MÜLLER, J. (2005): Erstnachweis eines Buschspötters *Hippolais caligata* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 1-10.
- MÜLLER, S. (1966): Nachweis eines Eissturmvogel in Brandenburg. Falke 13: 331.
- MÜLLER, S. (1978): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg. Jahresbericht für 1976. Ornithol. Rundbr. Mecklenburg N. F. 19: 39-69.
- VON MÜNCHHAUSEN, B. (1857): Notizen. Naumannia 7(2): 83-84.
- NACHTIGALL, W. (1999): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus* Linné, 1758) im nordöstlichen Harzvorland. Diplomarb. Univ. Halle-Wittenberg.
- NACHTIGALL, W. & W. GLEICHNER (2005): Mischbruten zwischen Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* – ein weiterer Fall aus Sachsen. Limicola 19: 180-194.
- NACHTIGALL, W., M. STUBBE & S. HERRMANN (2003): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Winter – eine telemetrische Studie im Nordharzvorland. J. Ornithol. 144: 284-294.
- VON NATHUSIUS, G. (1931): Beobachtungen und Seltenheiten 1930/31. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 5(2): 35-36.
- VON NATHUSIUS, G. (1939): Meine Vogelsammlung mit Beobachtungen aus den Jahren 1904-1939. Beitr. Avifauna Mitteldt. 3, Sonderh.: 1-26.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1803): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 4. Band.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1804): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 1. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1808): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 3. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1811): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 4. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. F. (1820): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 1. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1822): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 2. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1823): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 3. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1824): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 4. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1826): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 5. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1833): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 6. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1834): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 7. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1838): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 9. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1842): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 11. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1844): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 12. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1849): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. Naumannia 1(1): 1-11.
- NAUMANN, J. F. (1850): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in unserm Anhalt. Naumannia 1(2): 1-23.
- NAUMANN, J. F. (1854): Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung der vaterländischen Ornithologie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. Naumannia 4: 149-160.
- NAUMANN, J. F. (1860): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 13.: Nachträge und Verbesserungen. Stuttgart.
- NEUBAUER, R. (1908): Die Fauna Krosigks. Göttingen.
- NEUMANN, J. & U. KOLBE (1988): Der Eissturmvogel in der DDR. Falke 35: 14-17.
- NEUSCHULZ, F. (1988): Zur Synökie von Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (Bechst., 1795) und Neuntöter *Lanius collurio* (L., 1758). Ergebnisse einer populationsbiologischen Studie. Lüchow-Dannenberg Ornithol. Jber. 11: 1-234.
- NICOLAI, B. (1972): Der Vogelbestand einer Kontrollfläche in der Elbniederung westlich von Burg bei Magdeburg. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 69-82.
- NICOLAI, B. (1988a): Kartierung bestandsgefährdeter Brutvogelarten im Bezirk Magdeburg. Hinweise (4). Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Magdeburg 11(2): 1-4.
- NICOLAI, B. (1988b): Revierbesetzungsfolge beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Acta Ornithoecol. 1: 367-377.
- NICOLAI, B. (1992a): Quantitative Untersuchungen zum Polymorphismus der Gefiederfärbung beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Anz. Ver. Thür. Ornithol. 1: 65-72.
- NICOLAI, B. (1992b): Brutbiologische Angaben für den Hausrotschwanz in Sachsen-Anhalt. Apus 8: 66-77.
- NICOLAI, B. (1992c): Gesangsdialekt beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Tradierung und Gesangslernen. Rudolstädter nat.hist. Schr. 4: 83-90.
- NICOLAI, B. (1992d): Untersuchungen zur Nahrung und zum Nahrungserwerb des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 10: 75-105.

- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Jena & Stuttgart.
- NICOLAI, B. (1995): Bestand und Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Ostdeutschland. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 11-19.
- NICOLAI, B. (1997): Vögel (Aves) in: Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 233-243.
- NICOLAI, B. (2001): Über das Füttern fremder Jungvögel beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Anz. Ver. Thür. Ornithol. 4: 173-177.
- NICOLAI, B. (2002): Ökologie und Brutbiologie des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (S. G. GMELIN 1774) in Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 3-55.
- NICOLAI, B. (2006): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland. Situation 2006. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: 1-34.
- NICOLAI, B. (2011): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland: Situation 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 1-26.
- NICOLAI, B. (2012): Phänologie der Frühjahrsankunft beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* in Mitteldeutschland in den letzten 200 Jahren. Ökol. Vögel 34: 507-524.
- NICOLAI, B. & M. BIRTH (1975): Spurbereule bei Burg beobachtet. Apus 3: 284-285.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1997): Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans *Milvus milvus* im nordöstlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 73-87.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1999): Zur Bestandsentwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 109-112.
- NICOLAI, B., E. BRIESEMEISTER, H. STEIN & K. J. SEELIG (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises "Mittelbe – Börde". Magdeburg.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & M. HELLMANN (2009): Artenschutz beim Rotmilan. Zur aktuellen Situation in seinem Welt-Verbreitungszentrum Deutschland/Sachsen-Anhalt. Natursch. Landschaftspl. 41: 69-76.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & E. KARTHEUSER (2012): Rotmilane *Milvus milvus* als Opfer eines Hagelschlages. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 123-126.
- NICOLAI, B. & M. HELLMANN (2008): Der Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* im Harz und sein Vorkommen auf der Brockenkuppe. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 269-275.
- NICOLAI, B. & U. MAMMEN (2009): Dichtezentrum des Rotmilans *Milvus milvus* im Nordharzvorland – Bestandsentwicklung, Ursachen und Aussichten. Inform.dienst Natursch. Niedersachs. 29(3): 144-150.
- NICOLAI, B., U. MAMMEN & M. KOLBE (2017): Long-term changes in population and habitat selection of Red Kite in the region with the highest population density. Vogelwelt 137: 194-197.
- NICOLAI, B., F.-U. SCHMIDT & C. SCHMIDT (1996): Gefiedermerkmale, Maße und Alterskennzeichen des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*. Limicola 10: 1-41.
- NICOLAI, B. & M. WADEWITZ (2003): Die Brutvögel von Halberstadt. Ergebnisse einer Brutvogelkartierung 1998 bis 2002. Abh. Ber. Mus. Heineanum 6, Sonderh.: 1-187.
- NICOLAI, B. & F. WEIHE (2001): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland – Situation 2001. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 33-47.
- NIELITZ, U. & B. NICOLAI (2013): Außergewöhnlicher Fall einer ‚Doppelbrut‘ beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 65-72.
- NIETHAMMER, G. (1938): Handbuch der deutschen Vogelkunde. Bd. 2. Leipzig.
- NOTHDURFT, W. (1960): Die Vogelwelt von Buntenbock. Unser Harz, H. 3: 8-10.
- OBERBECK, H. (1906): Brutverhältnisse in der Saale-Niederung bei Bernburg. Ornithol. Monatsber. 14: 121-127.
- OLEJNIK, O. (2012): Beobachtungen zur Rufaktivität und zum Habitat der Wachtel *Coturnix coturnix* aus der nördlichen Altmark. Ornithol. Mitt. 64: 329-332.
- ORTLIEB, R. (1973): Über das Führen der Jungen bei der Wachtel. Falke 20: 318.
- ORTLIEB, R. (1974): Bruten des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 3: 108-113.
- ORTLIEB, R. (1980): Der Rotmilan. Neue Brehm-Bücherei 532. Wittenberg-Lutherstadt.
- ORTLIEB, R. (1982): Zur Bestandsentwicklung des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 5: 36-38.
- ORTLIEB, R. (1988): Kaiseradlerbeobachtung im Bezirk Halle. Falke 35: 230-231.
- OSTERWALD, D. (1951): Raubwürger als Stadtgast. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 45.
- OTTO, A. (1901): Katalog der Vogelsammlung des Gymnasiums zu Eisleben. nebst einer Übersicht über die in der Grafschaft Mansfeld beobachteten Vögel. Jber. Königl. Gymnasiums Eisleben 1901, Beil.: 1-55.
- OTTO, W. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 44-53.
- PÄSSLER, W. (1854): Ornithologische Aphorismen. J. Ornithol. 2: 180-182.
- PÄSSLER, W. (1856): Die Brutvögel Anhalts. J. Ornithol. 4: 34-68.
- PÄSSLER, W. (1857): Beobachtung über ziehende und brütende Vögel in Anhalt, im Frühjahr 1857. J. Ornithol. 5: 399-415.
- PÄSSLER, W. (1859): Etwas Ornithologisches aus Anhalt vom Jahre 1859. J. Ornithol. 7: 318-319.
- PÄSSLER, W. (1861): Beobachtungen in den Jahren 1859 und 1860 in der Umgegend von Mühlstedt und Rosslau, in Anhalt. J. Ornithol. 9: 433-439.
- PANOV, E. N. (1983): Die Würger der nördlichen Paläarktis. Neue Brehm-Bücherei 557. Wittenberg-Lutherstadt.
- PARKIN, D. T. & A. G. KNOX (2010): The Status of Birds in Britain and Ireland. London.
- PATZAK, U. (2003a): Die Bedeutung der Elbaue bei Wörlitz für Greifvögel. Apus 11: 385-394.
- PATZAK, U. (2003b): Die Gebäudebrüter der Stadt Dessau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 15: 105-120.

- PATZAK, U. & K.-J. SEELIG (2006): Die Brutvögel des Mittelbegebietes zwischen Mulde- und Saalemündung. Apus 13, Sonderh.: 1-119.
- PELNY, H.-J. (2002): Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Landkreis Lüchow-Danneberg von 1965 bis 2002. Lüchow-Dannebg. Ornithol. Jber. 15/16: 489-498.
- PERTL, C. & T. SPÄTH (2014): Ergebnisse der Erfassung wertgebender Brutvogelarten im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt) und EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 41-48.
- PIECHOCKI, R. (1954): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 1. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 3: 274-279.
- PIECHOCKI, R. (1979): Christian Ludwig Nitzsch, Ordinarius für Naturgeschichte an der Universität Halle, an Johann Friedrich Naumann. Wiss. H. Pädagog. Hochsch. Köthen 6(1): 49-76.
- PIETSCHMANN, G. (2002): Forstgeschichte und Waldentwicklung im Staatlichen Forstamt Nedlitz. Wald in Sachsen-Anhalt Bd. 12. Magdeburg.
- PIRL (1889): Eine Schneeeule erlegt bei Wittenberg. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 14: 168-170.
- PLASCHKA, F. (1970): Bestand und Ökologie der Greifvögel und Eulen des Kreises Merseburg. Zusammengestellt nach Untersuchungen im Jahre 1969. Apus 2: 152-156.
- PLATH, L. (1986): Die Brutvogelbestände an Hecken, Straßen und Wegen der Havelberger Oberfeldmark. Apus 6: 119-127.
- POHLE, W. & B. NICOLAI (2003): Beobachtungen an einem futterzahnenden Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 21: 27-38.
- PONTIUS, H. (1986): Die ornithologischen Sammlungen am Naturkundemuseum Erfurt. Nachweise in Thüringen seltener Vogelarten. Veröff. Naturkundemus. Erfurt 5: 86-96.
- POTAPOV, E. & R. SALE (2012): The Snowy Owl. London.
- PSCHORN, A. (2008a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Zeitzer Forst im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 35-41.
- PSCHORN, A. (2008b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 47-52.
- PSCHORN, A. (2011): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Raufußkauz (*Aegolius funereus*) und Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-82.
- PUZOVIC, S. (2000): Atlas Ptica Grabljiciva Srbije – Atlas of Birds of Prey of Serbia. Beograd.
- RESETARITZ, A. (2006): Ökologie überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* (Linné, 1758) im Nordharzvorland. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 4. Sonderbd.: 4-112.
- REY, E. (1871): Die Ornis von Halle. Z. ges. Naturwiss. 37 (N. F.): 453-489.
- REY, E. (1905): Die Eier der Vögel Mitteleuropas. Gera-Untermhaus.
- RIECHE, H. (1993): Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*, brütet im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 117.
- VON RIESENTHAL, O. (1876): Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropas. Kassel.
- RIMPAU, W. (1906): [Rotköpfige und schwarzstirnige Würger im Kreis Oschersleben]. Ornithol. Monatsschr. 31: 417.
- RIMROD, F.L. (1840/41): Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthum Anhalt-Bernburg. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1840/41: 8-12.
- RIMROD, F.L. (1842): Die Strich- und Zugvögel, welche die Grafschaft Mannsfeld und das Oberherzogthum Bernburg zu passieren pflegen. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1842, Beil.: 1-7.
- RIMROD, F.L. (1852): Einige ornithologische Wahrnehmungen und Bemerkungen. Naumannia 2(3): 21-24.
- RIMROD, F.L. (1866): Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theils unserer Sommervögel im Frühling. Nach zwanzigjähriger Beobachtung zu Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld, welcher Ort unter dem 51° 45' nördlicher Breite liegt. J. Ornithol. 14: 354-360.
- RINGLEBEN, H. (1934): Ein Beitrag zur Avifauna der Goldenen Aue. Ornithol. Monatsschr. 59: 142-159, 161-165.
- RINGLEBEN, H. (1953): Kommt der Felsenpieper im nordwestdeutschen Binnenland vor? Beitr. Naturkd. Niedersachs. 6: 82-86.
- RINGLEBEN, H. (1957): Bergpieper (*Anthus s. spinoletta* [L.]) in Niedersachsen. Ber. naturhist. Ges. Hannover: 103: 91-100.
- RINGLEBEN, H. (1959): Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel. Nat.kdl. Abh. Niedersächs. Landesmus. 1: 26-56.
- RINGLEBEN, H. (1968): "Gebirgsvögel" und andere Vogelarten im Harz. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 28-46.
- RINGLEBEN, H. (1974): Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land. I. Teil: Passeriformes. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 6: 85-96.
- ROCHLITZER, R. (1972): Zum gegenwärtigen Auftreten der Entenvögel und der Greifvögel im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst, Teilgebiet Lödderitzer Forst. Hercynia N.F. 9: 279-301.
- ROCHLITZER, R. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-220.
- ROCHLITZER, R. & H. KÜHNEL (1979): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-131.
- RÖDL, T., B.-U. RUDOLPH, I. GEIERSBERGER, K. WEIXLER & A. GÖRGEN (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Stuttgart
- RÖBLER, A. (2002): Rotmilan, Mäusebussard und Aaskrähe als Brutnachbarn. Apus 11: 207-208.
- RÖBLER, A. (2016): Über eine Mischbrut aus Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* in Sachsen-Anhalt. Apus 21: 79-81.
- ROHN, B. (1992): Rotmilan "schlägt" Elster. Apus 8: 128-129.
- ROST, F. (2009): Das Zugverhalten europäischer Mönchsgrasmücken *Sylvia atricapilla* im Wandel – Daten aus Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee. 19: 21-35.
- ROST, F. & H. GRIMM (2004): Kommentierte Liste der Vögel Thüringens. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 5, Sonderh.: 3-78.
- RUBACHA, S. & O. KRYSZEK (2007): Fourth record of the Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus* in Poland. Not. Ornithol. 48: 60-62.
- RÜDIGER, W. (1912): *Lanius excubitor*, Brutvogel in der Letzlinger Heide. Z. Ool. Ornithol. 22 (6): 11-12.

- RÜHLING, J.P. (1786): Verzeichnis der wilden Thiere auf dem Harze. In: GATTERER, C. W. J.: Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. T. 2., S. 248-284. Göttingen.
- RUPPE, S. & S. MATERNA (1990): Zur Brutbiologie und Ernährung des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.) im Kreis Sangerhausen. Beitr. Vogelkd. 36: 222-226.
- RYSLAVY, T. (2002): Weiterer Nachweis eines Rosapelikans (*Pelecanus onocrotalus*) in Brandenburg. Otis 10: 151-154.
- RYSEL, A. (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 43-46.
- RYSEL, A. & U. SCHWARZ (1981a): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 1]. Merseburger Land Sonderh. 18: 1-92.
- RYSEL, A. & U. SCHWARZ (1981b): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 2]. Merseburger Land Sonderh. 18: 1-91.
- SCHÄFER, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Zerbster Land im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 38-43.
- SCHÄFER, B. (2007): Revierkartierung wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Feldflur bei Kusey im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 73-82.
- SCHÄFER, B., W. LIPPERT & K.-J. SEELIG (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Colbitz-Letzlinger Heide im Jahr 2004/2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 33-45.
- SCHÄFER, B. & A. PSCHORN (2011): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg im Jahr 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-52.
- SCHÄFER, B. & K.-J. SEELIG (2015): Die Vögel (Aves) der Colbitz-Letzlinger Heide. Entomol. Mitt. Sachs.-Anhalt 23, Sonderh.: 355-399.
- SCHELPER, W. (1983): Der Rauhfußkauz in Altkreis Münden – ein Beispiel für angewandten Artenschutz. DBV-Gruppe Münden 1923-1983, Festschrift: 22-27.
- SCHERZINGER, W. (2006): Die Wiederbegründung des Habichtskauz-Vorkommens *Strix uralensis* im Böhmerwald. Ornithol. Anz. 45: 97-156.
- SCHMIDT, C. (1993): Die Unterscheidung des Spornpiepers *Anthus richardi* von unausgefärbten Brachpiepern *A. campestris*. Limicola 7: 178-190.
- SCHMIDT, F. & D. WEIS (1986): Der Brutvogelbestand des Peißnitz-Auwaldes in Halle. Apus 6: 177-182.
- SCHMIDT, W. (1987): Erstbeobachtung von Vogelarten. 10. Nachtrag 1986: Rauhfußkauz (*Aegolius funereus* L. 1758). Biol. Studien Luckau 16: 83-84.
- SCHMIEDEL, J. (1968): Der Wasserpieper im Stadtkreis Halle/S. Apus 1: 247-249.
- SCHNEIDER, R. (1963): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) und Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) am Barleber See bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 315-316.
- SCHNEIDER, R. (1969): Die Siedlungsdichte der Vögel einer Bruchlandschaft im nördlichen Harzvorland im Jahr 1962. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 3-12.
- SCHNEIDER, R. (1972): Schmutzgeier (*Neophron percnopterus* (L.)) über Oschersleben (Bode). Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 121.
- SCHNEIDER, R. (1981): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) 1981 bei Oschersleben (Bezirk Magdeburg). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 5-6: 94.
- SCHNEIDER, R. (2005): Die Siedlungsdichte der Vögel in einem Auwaldrest im Großen Bruch bei Oschersleben. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 73-87.
- SCHÖNBERG, R. & J. MÜLLER (1965): Zwergohreule (*Otus scops* [L.]) in der Börde. Beitr. Vogelkd. 11: 199-200.
- SCHÖNBRODT, M. & M. SCHULZE (2017): Rote Liste der Brutvögel des Landes Sachsen-Anhalt (3. Fassung, Stand November 2017 – Vorabdruck). Apus 22, Sonderheft: 3-80.
- SCHÖNBRODT, R. & T. SPRETKE (1989): Brutvogelatlas von Halle und Umgebung. Ergebnisse einer Feinrasterkartierung 1983-1986. Halle.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1987): Ergebnisse 10-jähriger Planberingung von jungen Greifvögeln in den Kreisen Halle, Halle-Neustadt und Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 67-84.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1991): Greifvogelhorstkontrollen der Jahre 1986 bis 1990 bei Halle. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 61-74.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2000): Greifvogelhorstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 153-166.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2006): 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel. Apus 13: 62-65.
- SCHÖNFELD, M. (1984): Migration, Sterblichkeit, Lebenserwartung und Geschlechtsreife mitteleuropäischer Rotmilane, *Milvus milvus* (L.), im Vergleich zum Schwarzmilan, *Milvus migrans* (Boddaert). Hercynia N.F. 21: 241-257.
- SCHÖNFELD, M. (1992): Untersuchung zur Vogelwelt eines Industriestandortes bei Wittenberg-Piesteritz. Apus 8: 120-126.
- SCHÖNFELD, M. (1995): Die Vogelwelt des Stadtfriedhofes Weißenfels/Saale in den Jahren 1973 bis 1975. Apus 9(1): 27-37.
- SCHÖNFELD, M. (1998): Zum Vorkommen, Neststand und Nestern des Neuntötters *Lanius collurio* und zum syntopen Vorkommen der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* im Mittelbegebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Ornithol. Mitt. 50: 221-226.
- SCHÖNFELD, M. (2002): Die Vogelwelt des Apollensberges – Landkreis Wittenberg. Apus 11: 255-260.
- SCHÖNFELD, M. (2006): Medianwerte der Erst- und Letztfeststellungen ausgewählter Zugvögel in Vergleich von 1975 bis 2005 sowie von Zehnjahreszeiträumen für den Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. 1. Teil: Jahresvögel, Teilzieher, Überwinterer Südeuropa/Nordafrika. Ornithol. Mitt. 58: 131-140.
- SCHÖNFELD, M. (2010): Abriss zur wissenschaftlichen Vogelberingung im Altkreis Wittenberg. Apus 15: 51-64.
- SCHÖNFELD, M. (2014): Frühjahrsankunft und Sangesbeginn von 50 Brutvogelarten in den Jahren 1975 bis 2012 im Altkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Mitt. 66: 187-218.
- SCHÖNFELD, M. & U. ZUPPKE (2008): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg. Apus 13: 373-415.
- SCHÖNN, S. (1980): Der Sperlingskauz. Neue Brehm-Bücherei 513. Wittenberg-Lutherstadt.

- SCHÖPWINKEL, A. (1892): Die Vogelwelt der Grafschaft Wernigerode. Schr. Naturwiss. Ver. Harzes Wernigerode 7: 1-62.
- SCHONERT, A. & B. SIMON (2014): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle von Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensraumtypen im NATURA 2000-Gebiet Mittlere Oranienbaumer Heide - Brutvögel. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 39-48.
- SCHUBERT, P. (1978): Schwarzstirnwürger bei Roßlau Elbe. Apus 4: 96.
- SCHUBERT, P. (1982): Ein Baßtöpel im Kreis Roßlau. Apus 4: 279.
- SCHUBERT, P. (1985a): Eine späte Brut des Neuntöters im Kreis Zerbst. Apus 6: 44-45.
- SCHUBERT, P. (1985b): Ein Nachtrag zum Vorkommen des Kolkrahen im Fläming. Apus 6: 81-88.
- VON DER SCHULENBURG, I. (1914): Von der Gebirgsbachstelze. Ornithol. Monatsschr. 39: 269-270.
- SCHULZ, F. (2008): Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*) mit auffällender Prägung auf Weißstörche (*Ciconia ciconia*) in Norddeutschland im Jahr 2001. In: KAATZ, C. & M. KAATZ, 3. Jubiläumband Weißstorch: 432-434.
- SCHULZE, M. (2004): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 69-75.
- SCHULZE, M. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Saale-Elster-Aue südlich Halle im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 106-117.
- SCHULZE, M. (2005b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2004/05. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 126-132.
- SCHULZE, M. (2006): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2005/2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 63-72.
- SCHULZE, M. (2007): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2006/2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 109-119.
- SCHULZE, M. (2008): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2007/2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-90.
- SCHULZE, M. (2009): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2008/09. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 67-78.
- SCHULZE, M. (2010): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2009/10. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-84.
- SCHULZE, M. (2011): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2010/11. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 95-107.
- SCHULZE, M. (2012): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2011/12. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 95-106.
- SCHULZE, M. (2014a): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2012/13. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 61-74.
- SCHULZE, M. (2014b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2013/14. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 49-62.
- SCHULZE, M., D. LÄMMELE & A. PSCHORN (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 53-64.
- SCHULZE, M. & A. PSCHORN (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Mittlere Oranienbaumer Heide im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 47-56.
- SCHULZE, M., A. RYSEL & A. PSCHORN (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Buchenwälder um Stolberg im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 101-108.
- SCHULZE, W. (1957): Ein Steinadler im Harz. Falke 4: 215.
- SCHULZE, W. (1985): Rotkopfwürger brütet von 1975-1980 bei Sangerhausen. Apus 6: 43-44.
- SCHULTZ, H. (1990): Brut des Rotmilans auf Hochspannungsmast. Apus 7: 267.
- SCHWARZ, U. (1992): Erfolgreiche Rotmilanbrut auf Hochspannungsmast. Apus 8: 59-61.
- SCHWARZ, W. & H. TISCHER (1929): Aus der Brutperiode 1928 im Magdeburger Beobachtungsgebiet. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 3(2): 7-12.
- SCHWARZE, D. (1995): Weißkopf-Ruderente bei Roßlau. Apus 9: 59-60.
- SCHWARZE, E. (1968): Schelladler und Eisente bei Roßlau. Apus 1: 196-197.
- SCHWARZE, E. (1980): Einige Nachweise südlich verbreiteter Vogelarten in den Kreisen Roßlau und Dessau. Apus 4: 171-175.
- SCHWARZE, E. (1986): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kreis Roßlau, Bezirk Halle). 3. Teil: Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 23-33.
- SCHWARZE, E. (2010): Spornpieper *Anthus richardii* erstmals in Sachsen-Anhalt. Apus 15: 72-73.
- SCHWARZE, E. & H. KOLBE (2006): Die Vogelwelt der zentralen Mittelelbe-Region. Halle.
- SCHWARZE, E. & G. PUHLMANN (2012): Ergänzungen zum Vorkommen einiger Watvogelarten (Aves: Charadriiformes) im zentralen Mittelelbegebiet und am Stausee Ladeburg (Landkreis Jerichower Land). Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 24: 123-128.
- SCHWERDTFEGER, O. (2008): Ist der Raufußkauz *Aegolius funereus* ein echter Harzer? – Über die Bedeutung einer lokalen Population. Vogelkundler. Ber. Niedersachs. 40: 247-253.
- SEELIG, K.-J., H.-G. BENECKE, F. BRAUMANN & B. NICOLAI (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abh. Ber. Mus. Heineanum 3, Sonderh.: 1-243.
- SELLIN, D. (1965): Sperbereule (*Surnia ulula*) in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 86: 61-62.
- SELLIN, D. (1967): Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) als Freibrüter. Beitr. Vogelkd. 12: 429-436.
- SELLIN, D. (1968a): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Coswig im Jahre 1967. Apus 1: 239-242.
- SELLIN, D. (1968b): Zur Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) in der nordwestlichen Umgebung Magdeburgs. Vogelwelt 88: 79-83.

- SELLIN, D. (1973): Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. Apus 3: 34-36.
- SELLIN, D. (1994): Notizen zum Vorkommen der Wachtel im Raum Wolfen-Zörbig. Apus 8: 265-271.
- SIMON, B. (1987): Untersuchung zum Bestand der Taggreifvögel (Falconiformes) im Elbniederungsgebiet südlich der unteren Schwarzen Elster. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 85-98.
- SIMON, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Annaburger Heide in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 118-125.
- SIMON, B. & U. SIMON (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mündungsgebiet der Schwarzen Elster im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-65.
- SLACK, R. (2009): Rare birds where and when. An analysis of status and distribution in Britain and Ireland. Vol. 1: sandgrouse to New World orioles. York.
- SORGE, C. (1923): *Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.), der gabelschwänzige Schwalbensturmvogel, in Nordthüringen. Ornithol. Monatsber. 31: 16-17.
- SOMMER, G. (1957): Baßtölpel bei Merseburg. Falke 4: 105.
- SOMMER, O. (1893): Notizen aus Bernburg. Ornithol. Monatsber. 1: 85.
- SPERLING, E. (1933): *Podiceps n. nigricollis* bei Schollene als Brutvogel verschwunden? Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 7: 17-19.
- SPERLING, E. (1934): *Motacilla c. cinerea* auf dem Zug in Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 8: 31.
- SPRETKE, T. (1982a): Avifaunistischer Jahresbericht 1977 für den Bezirk Halle. Apus 5: 1-13.
- SPRETKE, T. (1982b): Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. Apus 5: 13-25.
- SPRETKE, T. (1986): Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Bezirk Halle. Apus 6: 98-110.
- SPRETKE, T. (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle. Apus 6: 193-204.
- STAAR, A., G. DORNBUSCH, S. FISCHER & A. HOCHBAUM (2015): Entwicklung und Bestand von Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst/Untersuchungsgebiet Steckby von 1991 bis 2015. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 43-53.
- STACHOWIAK, G. (1959): Der Rote Milan und seine Siedlungsdichte im Hohen Holz. Abschlussarb., Forstfachschr. Schwarzburg (unveröff.).
- STAHL, E. (1996): Die Rote Liste der Brutvögel der Stadt Dessau und der unmittelbaren Umgebung. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 9: 119-133.
- STARKE, W., A. STIEFEL & R. STIEFEL (1974): Erneute Brutnachweise des Rotkopfwürgers im Gebiet des Süßen Sees. Apus 3: 115-117.
- STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (1998): Die Vogelwelt Sachsens. Jena.
- STEIN, H. (1968): Siedlungsdichteuntersuchung in einem Auwald bei Magdeburg. Mitt. IG Avifauna DDR 1: 29-39.
- STEIN, H. (1969): Der Barleber See bei Magdeburg – ein Rast- und Überwinterungsgewässer für Wasservögel. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 4: 25-54.
- STEIN, H. (1972): Über Ankunft und Legebeginn des Neuntötters in den Bezirken Magdeburg und Halle. Apus 2: 266-272.
- STEIN, H. (1973): Der Vogelbestand eines Torfstiches in der Niederung der Unterhavel. Mitt. IG Avifauna DDR 6: 53-58.
- STEIN, H. (1974): Ein Beitrag zur Brutbiologie von Singdrossel, *Turdus philomelos*, Amsel, *Turdus merula*, und Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla*, mit besonderer Berücksichtigung der Brutverluste. Beitr. Vogelkd. 20: 467-477.
- STEIN, H. (2000): Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* und Dorngrasmücke *Sylvia communis* im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 93-128.
- STEIN, H. (2008): Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers *Phylloscopus proregulus* in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 348-349.
- STEIN, H. & P. GOTTSCHALK (2004): Die Dorngrasmücke *Sylvia communis* als Hiddensee-Ringvogel – Ergebnisse 25-jähriger Beringungsarbeit in Ostdeutschland. Apus 12, Sonderh.: 52-75.
- STEINKE, G. (1999): Die Vögel der Altmark. Stendal.
- STEINKE, G. & K. HEINDORFF (1982): Die Vögel des Kreises Tangerhütte. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 7: 1-105.
- STRESEMANN, E. (1954): Zur Avifauna der Mark Brandenburg. J. Ornithol. 95: 178-181.
- STUBBE, C. (1961): Die Besiedelungsdichte eines abgeschlossenen Waldgebietes (Hakel) mit Greifvögeln im Jahre 1957. Beitr. Vogelkd. 7: 155-224.
- STUBBE, M. (1982): Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population – *Milvus milvus* (L., 1758) – im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L., 1758). Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 22: 205-214.
- STUBBE, M. (1987): Die Erforschung der Greifvogel- und Eulenarten in der DDR – Stand und Perspektive. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 9-26.
- STUBBE, M. (1991): Der Hakel als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. Ber. Dt. Sekt. Internat. Rates Vogelsch. 30: 93-105.
- STUBBE, M. & A. STUBBE (2000): Zwergohreulen (*Otus scops*) im Hakelgebiet/Sachsen-Anhalt. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten; Bd. 4: 522.
- STUBBE, M. & K. UHLENHAUT (1977): Habichtsadler in der DDR. Falke 24: 192-197.
- STUBBE, M., M. WEBER, T. HOFMANN & S. HERRMANN (1996): Der Zwergadler *Hieraetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. Limicola 10: 171-177.
- STUBBE, M., H. ZÖRNER, H. MATTHES & W. BÖHM (1991): Reproduktionsrate und gegenwärtiges Nahrungsspektrum einiger Greifvogelarten im Nördlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 39-60.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, W. FREDERKING, K. GEDDON, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, J. KARTHÄUSER, T. LANGGMACH, B. SCHUSTER, S. TRAUTMANN & J. WAHL (2013): Vögel in Deutschland – 2013. Münster.
- TASCHENBERG, O. (1893): Die Avifauna in der Umgebung von Halle I. Ornithol. Monatsschr. 18: 133-142.
- TAUCHNITZ, H. (1966): Schwarzstirnwürger bei Halle/S. Apus 1: 54.

- TAUCHNITZ, H. (1968): Zur Brutbiologie und Brutdichte des Rotrückenwürgers in einem Auegebiet bei Halle. *Apus* 1: 229-233.
- TAUCHNITZ, H. (1970): Die Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. *Apus* 2: 32-38.
- TAUCHNITZ, H. (1975): Beobachtung einer Maskenstelze bei Halle. *Apus* 3: 287-289.
- TAUCHNITZ, H. (1977): Beobachtungen an einem Schlafplatz des Bergpiepers bei Halle. *Apus* 4: 9-14.
- TAUCHNITZ, H. (1981): Die Vögel der Saale-Elster-Aue im Südteil des Stadtkreises Halle. *Apus* 4: 193-240.
- TAUCHNITZ, H. (2005): Greifvögel in der Saale-Elster-Aue südlich Halle (Saale). Brutbestand, Bruterfolg und Brutgröße von Rotmilan, Schwarzmilan und Mäusebussard zwischen 1976 und 2003. *Apus* 12: 303-313.
- TEICHMANN, A. (1975): Adlerbussard (*Buteo rufinus* Cretzschm.) bei Halle. *Beitr. Vogelkd.* 21: 496-497.
- TEICHMANN, A. (1987): Seeregenpfeifer im Binnenland. *Apus* 6: 222-225.
- THIELE, A. (1857): Auszüge aus meinem Tagebuch. *Naumannia* 7(2): 43-52.
- THIENEMANN, G. A. (1852): Einige Bemerkungen über Albino's in der ornithologischen Welt. *Naumannia* 2(2): 40-42.
- THIENEMANN, J. A. (1899): *Lanius excubitor major*. *Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt* 24: 354-355.
- THIOLLAY, J.-M. & V. BRETAGNOLLE (2004): *Rapaces nicheurs de France*. Paris.
- TISCHER, H. (1928): Ornithologisch Interessantes für Magdeburg und Umgebung aus den Jahren 1822-1850 (Fortsetzung und Schluss). *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 2(1): 1-9.
- TODTE, I. (1983): Ungewöhnlich hoher Neststandort des Rotrückenwürgers. *Apus* 5: 99.
- TODTE, I. (1986): Polygynie beim Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros*. *Beitr. Vogelkd.* 32: 341-342.
- TODTE, I. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg im Jahr 2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 94-99.
- TODTE, I. & B. NICOLAI (2001): Aktueller Nachweis der Wanderdrossel *Turdus migratorius* für Deutschland. *Limicola* 15: 157-162.
- TOLKMITT, D., D. BECKER, M. HELLMANN, E. GÜNTHER, F. WEIHE, H. ZANG & B. NICOLAI (2012): Einfluss des Waschbären *Procyon lotor* auf Siedlungsdichte und Bruterfolg von Vogelarten – Fallbeispiele aus dem Harz und seinem nördlichen Vorland. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 30: 17-46.
- TORKLER, A. & H. LANGBEHN (2009): Der Sperlingskauz (*Glauucidium passerinum*) im Landkreis Lüneburg – von der heimlichen „Geistereule“ zum verbreiteten Brutvogel. *Beitr. Avif. Landkr. Lüneburg 2001-2007*. Bd. 6: 169-175.
- TRAUE, H. (1970): Zur Ernährung des Rotmilan (*Milvus milvus* L.) während der Brut- und Fütterungsperiode im Verlaufe der Jahre 1962 bis 1967. *Naturforsch. naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg* 7: 38-57.
- TRAUE, H. (1978): Zur Brutperiode einer Greifvogelpopulation im Mansfeld-Harzgeroder Bergland im Verlauf der Jahre von 1962 bis 1967. *Falke* 25: 6-11, 50-54.
- TRAUE, H. & K. WUTTKY (1966): Die Entwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus* L.) vom Ei bis zum flüggen Vogel. *Beitr. Vogelkd.* 11: 253-275.
- TRAUTMANN, S., J. SCHWARZ & S. FISCHER (2012): Das Monitoring häufiger Brutvögel in Sachsen-Anhalt – Zwischenergebnisse nach acht Jahren Laufzeit (2003 bis 2010). *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H.* 1: 71-84.
- TUCHSCHERER, K. (1966): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Gohrau/Wörlitzer Winkel 1966 [I]. *Apus* 1: 74-80.
- UHLHENHAUT, K. (1998): Zur Räumung der von Nathusius'schen Vogelsammlung aus dem Schloß Hundisburg Ende November 1945. *Haldensleber Vogelkd.-Inform.* 16: 77-79.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil I. *Wolmirstedter Beitr.* 11: 3-63.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1988): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil II. *Wolmirstedter Beitr.* 13: 3-75.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1989): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil III. *Wolmirstedter Beitr.* 14: 3-66.
- VON VELTHEIM, H. H. (1924): Ein Uralkauz in Mitteldeutschland. *Mitt. Vogelwelt* 23: 89.
- VIEWEG, A. (1979): Der Waldkauz – eine Gefahr für den Raufußkauz. *Falke* 26: 392-393.
- VOERKEL, S. H. (1926): Beitrag zur Avifauna des Torgau-Annaburg-Jessener Gebietes. *Ornithol. Monatsschr.* 51: 25-40.
- VOIGT, W. (1908): Altes und Neues vom Harz. *Ornithol. Monatschr.* 33: 38-39.
- VOOUS, K. H. (1962): Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Hamburg, Berlin.
- WADEWITZ, M. (1995): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 1: Nonpasseriformes. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 13: 53-100.
- WADEWITZ, M. (1996): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 2: Passeriformes. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 14: 11-47.
- WADEWITZ, M. (2004): Entwicklung von Vogelbeständen auf den Friedhöfen in der gehölzarmen Ackerlandschaft der Börde 1996 bis 2004. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 22: 59-81.
- WADEWITZ, M. (2008): Bestand von Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 26: 117-129.
- WADEWITZ, M. (2009): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 27: 61-78.
- WADEWITZ, M. (2010): Bestandsentwicklung und Vertikalvorkommen häufiger Brutvogelarten in den Hochlagen des Harzes: Untersuchungen von 1982 bis 2010 am Hohnekopf. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 28: 37-63.
- WADEWITZ, M. (2012a): Brutvögel auf einem Trockenrasen am Huy 1995-2012: Auf und Ab mit Büschen. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 30: 63-80.
- WADEWITZ, M. (2012b): Abhängigkeit des Legebeginns vom Vertikalvorkommen bei der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* im Harz. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 30: 107-118.



- WAGNER, M. & M. JENTZSCH (2000): Zur Verbreitung, Populationsdynamik und Nahrungsökologie des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus* L.) im Südharz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 51-70.
- WAGNER, M. & J. SCHEUER (2003): Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee. Bürgel.
- WAHN, R. (1930): Der Schwarzhalstaucher Brutvogel der Michelschen Teiche. Beitr. Avifauna Anhalts 1(4): 14.
- WAHN, R. (1937): Gedanken und Beobachtungen über den Frühjahrszug 1937. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 1-7.
- WAHN, R. (1939): Bestandsschwankungen vieler Vogelarten. Beitr. Avifauna Mitteldt. 3(1-2): 33-35.
- WAHN, R. (1950): Beobachtungen und Gedanken am Nest der Mönchsgrasmücke. Vogelwelt 71: 33-39.
- WAHN, R. (1951): Bestandsschwankungen unserer Vogelwelt in letzten drei Jahrzehnten. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 9-23.
- WALTHER, H. (1972): Erster Nachweis einer Brut des Wasserpiepers [*Anthus s. spinoletta* (L.)] im Harz. Beitr. Vogelkd. 18: 455-456.
- WATSON, J. (2010): The Golden Eagle. 2. Aufl., London.
- WEBER, B. (1950): Rotkehlchen-Flavino und Mönchsgrasmücken-Albino. Ornithol. Mitt. 2: 199.
- WEBER, B. (1957): Rotkopfwürger, *Lanius senator*, Brutvogel im Drömling (Altmark). Beitr. Vogelkd. 5: 235-237.
- WEBER, B. (1965): Milane als Nahrungsschmarotzer im Stadtgebiet. Falke 12: 317-318.
- WEBER, B. (1976): Bemerkenswerte Vogelfunde im Kreis Haldensleben von 1957 bis 1973. Beitr. Vogelkd. 22: 83-100.
- WEBER, B. (1993): Wilhelm Riesel (1871-1951) aus Haldensleben – Erfahrungen und Erinnerungen eines alten Vogelfreundes Haldensleber Vogelkd.-Inform. 11: 49-69.
- WEBER, M. (2002): Untersuchungen zu Greifvogelbestand, Habitatstruktur und Habitatsveränderungen in ausgewählten Gebieten von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 3. Ergebnisbd.: 1-114.
- WEBER, M., W. FIEBER & M. STUBBE (1998): Persistente chlororganische Verbindungen, Quecksilber und radioaktive Nuklide in Eiern von Rotmilanen (*Milvus milvus*) aus Sachsen-Anhalt. J. Ornithol. 139: 141-147.
- WEBER, M., L. KRATZSCH & M. STUBBE (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Hakel im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 49-57.
- WEBER, M., L. KRATZSCH, M. STUBBE, H. ZÖRNER, W. LÜTJENS, H. DOMKE & A. STUBBE (2009): Bestandssituation und Reproduktion ausgewählter Greifvogelarten in verschiedenen Gebieten des Nordharzvorlandes (Sachsen-Anhalt). Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 6: 167-179.
- WEBER, M. & M. STUBBE (1995): Biometrische Untersuchungen zu Eierschalenveränderungen bei Rotmilan (*Milvus milvus*), Schwarzmilan (*Milvus migrans*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) nach 1950. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 133-139.
- WEBER, M. & M. STUBBE (2000): Nahrungsangebot und Nahrungswahl von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im nordöstlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 203-222.
- WEGENER, U. (1968): Die Siedlungsdichte von Greifvögeln in einem Waldgebiet (Huy) des Nordharz-Vorlandes. Falke 15: 328-335.
- WEGST, C. (2008): Der Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 22: 161-175.
- WEIßGERBER, R. (1986): Siedlungsdichteuntersuchung im Zeitzer Tiergartengehölz. Apus 6: 127-129.
- WEIßGERBER, R. (1987a): Bruten der Gebirgsstelze im Südzipfel des Bezirkes Halle. Apus 6: 269-273.
- WEIßGERBER, R. (1990): Zum Legebeginn der Gebirgsstelze. Apus 7: 274.
- WEIßGERBER, R. (1992): Brutvogelbestand in rekultivierten Tagebaurestlöchern. Apus 8: 23-29.
- WEIßGERBER, R. (1995): Zum Vorkommen des Rotmilans im Zeitzer Gebiet. Apus 9: 69-74.
- WEIßGERBER, R. (1996): Brutverbreitung und Habitat des Neuntöters im Süden des Burgenlandkreises. Apus 9: 180-183.
- WEIßGERBER, R. (1999): Rothals- und Schwarzhalstaucher Brutvögel im südlichen Burgenland-Kreis. Apus 10: 196-198.
- WEIßGERBER, R. (2002): Zum Vorkommen einiger Brutvogelarten in der Aue der Weißen Elster nordöstlich von Zeitz. Apus 11: 187-195.
- WEIßGERBER, R. (2007): Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes. Apus 13, Sonderh.: 1-191.
- WEIßGERBER, R. (2011): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in der Aue der Weißen Elster bei Zeitz. Apus 16: 41-46.
- WEIßGERBER, R. & H. GEHLHAAR (1999): Häufigkeitsverteilung von *Sylvia communis*, *S. curruca*, *S. borin* und *S. atricapilla* während der Zugzeiten in der Zeitzer Tagebaufolgelandschaft. Mauritiania 17: 325-332.
- WEIßGERBER, R. & K. KRESSE (2002): Die Brutvogelfauna kleiner Bachtäler im Grenzbereich von Zeitzer Hügelland und Leipziger Tieflandsbucht. Apus 11: 235-246.
- WEIßGERBER, R. & G. SMYK (2002): Die Ornithozönose eines Sanddornbestandes bei Lucka im Landkreis Altenburger Land (Ostthüringen). Mauritiania 18: 251-261.
- WELK, D. & F. BRAUMANN (2003): Avifaunistischer Jahresbericht 2001 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 21: 35-59.
- WENZEL, K. (1895): Ornithologisches aus der Umgebung von Halle. I.-III. Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 20: 150-155, 198-203, 218-222.
- WENZEL, K. (1901): Beobachtungen über den Kuckuck bei Halle nebst einigen Bemerkungen zur Naturgeschichte des Kuckucks. Z. Ool. 11: 55-60.
- WENZEL, K. (1908): Zur Naturgeschichte des Kuckucks und seiner Brutpfleger. Ornithol. Monatsschr. 33: 462-475.
- WENZEL, K. (1914): Neues zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks. Ornithol. Monatsschr. 39: 457-464.
- WERNER, J. (1961): Eissturmvogel, *Fulmarus glacialis*, im Harz. J. Ornithol. 102: 96.
- WESTPHAL, J. (1979): Rotkopfwürger-Paar 1977 bei Schraplau. Apus 4: 143.
- WEX, H. (1938): Sperbergrasmücke bei Biederitz. Beitr. Avifauna Mitteldt. 2(2): 46.
- WIESNER, J. (1997): Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. Naturschutzreport 13: 82-98.

- WIESNER, J., H. ZANG & H. HECKENROTH (1992): Brut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Harz. Acta ornithocol. 2: 327-329.
- WINKLER, P. (1955): Zum Vorkommen des Schwarzstirnwürgers, *Lanius minor*, in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 4: 171.
- WITSACK, W. (1968b): Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarellii* Gould) an den Runstedter Klärteichen nördlich Halberstadt. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109.
- WITSACK, W. (1969a): Die Siedlungsdichte der Vögel zweier Grünlandtypen im Nordharz und im Nordharzvorland. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 13-20.
- WÜRL, R. (2009): Ein Rosapelikan auf Reisen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 132-133.
- WÜST, W. (1981): Avifauna Bavariae – Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. München.
- WUTTKY, K. (1963): Beutetier-Funde in Greifvogelhorsten des Hakei. Ein Beitrag zur Ernährungsbiologie und zum Greifvogelschutz. Beitr. Vogelkd. 9: 140-171.
- WUTTKY, K. (1964): Schnee-Eule, *Nyctea scandiaca* L., in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 9: 382.
- WUTTKY, K. (1967): Blitzschlag als Todesursache beim Rotmilan (*Milvus milvus* L.). Beitr. Vogelkd. 12: 370.
- WUTTKY, K. (1968): Ergebnisse 10jähriger Beobachtungen an der Greifvogelpopulation des Wildforschungsgebietes Hakei (Kr. Aschersleben). Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 104: 159-173.
- ZANG, H. (1981): Zum Status des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Harz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124: 279-289.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (1986): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.7.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (2001): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.8.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & F. KNOLLE (1989): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.3.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2005): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.9.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2009): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.11.
- ZAPPE, K. (1975): Erster Brutnachweis für den Raubwürger im Kreis Bernburg. Apus 3: 289.
- ZIEMER, E. (1885): Notizen aus Halle. J. Ornithol. 33: 225-337.
- ZINK, G. (1975): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Möggingen.
- ZINK, G. (1981): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Radolfzell.
- ZINK, G. & F. BAIRLEIN (1995): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 5. Wiesbaden.
- ZÖRNER, G.-J. (1992): Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Purnitzaue (Altmark). Apus 8: 30-31.
- ZÖRNER, G.-J. (1993): Brutvogelerfassung in verschiedenen Wald- und Forstflächen der Altmark. Apus 8: 201-220.
- ZUPPKE, U. (1975): Zwergmaus als Raubwürgerbeute. Falke 22: 175.
- ZUPPKE, U. (1976): Raubwürger im Kreis Wittenberg. Falke 23: 426-429.
- ZUPPKE, U. (2002): Rauhfußkauz im Fläming bei Wittenberg. Apus 11: 276-277.
- ZUPPKE, U. (2009): Die Vogelwelt der Region Lutherstadt Wittenberg. Norderstedt.