

Schmutzgeier *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)

• Ausnahmeerscheinung

• Anhang I EU-VSchRL

Die nächsten Brutplätze des Schmutzgeiers liegen in Südfrankreich (GALLARDO & KOBIERZYCKI in THIOLLEY & BRETAGNOLLE 2004) und Serbien (GRUBAC & MARINKOVIC in PUZOVIC 2000). Den Winter verbringen die europäischen Vögel in Afrika südlich der Sahara. In Mitteleuropa taucht der Schmutzgeier nur selten, zumeist in den Monaten April bis Juni, auf. Dabei dürfte es sich überwiegend um Fälle von Zugprolongation handeln.

Für Sachsen-Anhalt liegt lediglich ein gesicherter Nachweis vor. Am 22.05.1972 gelang die Beobachtung eines Vogels über dem Stadtgebiet von Oschersleben/BK (SCHNEIDER 1972).

Beobachtungen eines immat. Ind. am 05.11.2000 bei Köthen/ABI (GEORGE & WADEWITZ 2001) und eines vorjährigen Ind. am 26.07.2007 bei Wörlitz/WB (DORNBUSCH 2012) wurden nicht ausreichend dokumentiert bzw. von der Seltenheitenkommission abgelehnt.

Dirk Tolkmitt
[09/2015]